

Silmox CL

*Amoxicilina tri-hidratada
Clavulanato de potássio*

*Comprimidos mastigáveis e
palatáveis para cães e gatos*

USO VETERINÁRIO

Fórmula:

Cada comprimido de 50 mg (Amoxicilina + Ácido Clavulânico) contém:

Amoxicilina (AmoxicilinaTri-hidratada).....	40 mg
Ácido Clavulânico (Clavulanato de Potássio).....	10 mg
Excipiente q.s.p.....	200 mg

Cada comprimido de 300 mg (Amoxicilina + Ácido Clavulânico) contém:

Amoxicilina (AmoxicilinaTri-hidratada).....	240 mg
Ácido Clavulânico (Clavulanato de Potássio).....	60 mg
Excipiente q.s.p.....	1200 mg

Indicações de uso: Silmox CL apresenta um amplo espectro de atividade, atuando contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas (inclusive cepas produtoras de beta-lactamases). Tal característica, associada a excelente distribuição e persistência da associação Amoxicilina e Ácido Clavulânico no organismo animal, permitem a utilização do medicamento nos variados processos infecciosos de cães e gatos, tais como: infecções periodontais (cepas sensíveis de bactérias aeróbicas e anaeróbicas), piodermites e infecções dos tecidos moles (*Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus intermedius*, *Escherichia coli*, *Proteus* spp, *Pasteurella* spp, *Streptococcus* spp, *Corynebacterium* spp, *Bacillus* spp, *Fusobacterium necrophorum*, *Moraxella* spp), infecções do trato urinário (incluindo aquelas causadas por cepas sensíveis de: *Escherichia coli*), infecções respiratórias (produzidas por: *Staphylococcus* spp, *Pasteurella* spp, *Bordetella bronchiseptica*, *Haemophilus* spp, *Streptococcus* spp), Infecções do trato gastrointestinal (tais como as diarreias causadas por *Escherichia coli*, *Klebsiella* spp, *Proteus* spp, *Salmonella* spp).

Posologia e Modo de uso: Administrar o produto diretamente da embalagem na base da língua do animal, inteiro ou fragmentado, de acordo com a dose. O comprimido poderá ser mastigado ou engolido inteiro. Assegure-se de que o animal tenha deglutido toda a quantidade do medicamento fornecida. Em cães e gatos, a eficácia terapêutica do produto não é significativamente afetada pela ingestão concomitante de alimento. Manter água a vontade.

A duração do tratamento é de 5 a 7 dias consecutivos, duas vezes ao dia ou a critério do médico veterinário. No caso das piodermites, a terapia poderá se prolongar por até 21 dias e nas infecções de trato urinário poderá durar de 10 a 14 dias. O tempo máximo do tratamento não deve exceder a 30 dias. Se não ocorrer melhora clínica em 5 dias, a terapia deverá ser suspensa e o caso reavaliado.

Comprimidos de SilmoX CL 50 mg:

Peso	Quantidade do produto
2 kg	½ comp.
4 kg	1 comp.
6 kg	1 e ½ comp.
8 kg	2 comp.

Comprimidos de SilmoX CL 300 mg:

Peso	Quantidade do produto
12 kg	½ comp.
24 kg	1 comp.
36 kg	1 e ½ comp.
48 kg	2 comp.

Precauções:

Caso ocorra prenhes durante ou logo após o tratamento, informar imediatamente ao médico veterinário. O profissional também deverá ser notificado se o animal estiver amamentando.

Contraindicações:

O medicamento é contraindicado para equinos, coelhos e pequenos herbívoros devido à intolerância gastrointestinal que pode produzir.

Como o produto contém uma penicilina semissintética, verifique se há antecedentes alérgicos antes de administrá-lo. No caso de reações alérgicas, usar adrenalina e medicação de suporte adequado sob orientação do médico veterinário.

A segurança da administração do produto em fêmeas prenhes ou em período de reprodução ainda não foi bem estabelecida.

O produto não é recomendado para cadelas e gatas amamentando seus filhotes.

O medicamento deve ser administrado com cuidado na presença de insuficiência renal grave. Tal condição requer uma observação clínica minuciosa, pois a dose segura poderá ser menor que a usualmente recomendada.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Modo de Conservação:

O produto deve ser mantido na embalagem original até a completa utilização, entre 15 e 30°C, ao abrigo da luz solar, umidade e calor, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Apresentação:

Cartucho contendo 10 comprimidos de 50 mg ou 300 mg de princípio ativo.

Licenciado no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento sob o nº 062/2003 em 17/09/2015.

Responsável Técnico: Dr. Alan Fioroni Kastein CRF-SP 31640.

Proprietário e Fabricante:



Vansil Indústria Comércio e Representações Ltda.

Rua João Augusto Cirelli, nº 640. Distrito Industrial.

Sac Veterinário: 55 (19) 3593-9999 - Indústria Brasileira

CNPJ: 50.472.547/0001-68 Inscrição Estadual: 285.007.656.112

e-mail: vansil@vansil.com.br www.vansil.com.br