


PROTOCOLO VANSIL MASTITE AGUDA



► Protocolo Mastite Aguda

Sintomas: úbere inchado, brusca diminuição ou interrupção da produção de leite, leite produzido apresentando aspecto aquoso.

UBRECILIN

Antimastítico Intramamário de Largo Espectro. Não necessita de refrigeração.
Neomicina - 500 mg
Cloxacilina - 200 mg



FENILVET

Anti-inflamatório, analgésico e antipirético injetável não hormonal à base de Fenilbutazona.



FORTLOZIN

Antibiótico de Amplo Espectro à base de Tilosina.



- Aplicar 10 ml por teto contaminado 1 vez ao dia, durante 3 dias.

*Carência 3 dias



- Aplicar 1ml/50 kg, por via endovenosa, 1 vez ao dia, durante 3 dias.

- Aplicar 1ml/20 kg, por via intramuscular, 1 vez ao dia, durante no mínimo 3 dias.

*Carência 3 dias



IODOFARM

Desinfetante à base de Iodo

Assepsia dos úberes e mãos dos ordenhadores: 100 mL / 2,5 litros de água
Pedilúvio: 100 mL / 5 litros de água



RICINUS

Pomada hidratante

Aplicar uma fina camada nos locais com rachaduras.

MASTITE E SEUS IMPACTOS NAS PERDAS DA PRODUÇÃO

A Mastite é uma enfermidade de caráter infeccioso que acomete a glândula mamária das vacas, podendo ser clínica ou subclínica. Sua prevalência está relacionada aos fatores ambientais e manejo dos animais, devido à presença de diversos tipos de bactérias, dentre as mais frequentes *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis*, *Escherichia coli*, *Klebsiella sp.* e *Pseudomonas aeruginosa*. Com isso, decorrem prejuízos econômicos com perda da produção que pode chegar a 25% do total produzido.



Contagiosa
(*Streptococcus agalactiae*)



Ambiental
(*Escherichia coli*)



Exemplo
de Mastite



CONECTE-SE COM A GENTE



www.vansil.com.br

VANSIL
saúde animal



PROTOCOLO VANSIL MASTITE CRÔNICA

► Protocolo Mastite Crônica

Animal que já teve vários episódios de mastite, geralmente de 15 dias entre uma e outra.
Alterações no leite (grumos), úbere avermelhado, podendo haver inchaço.

SILMAST

Antibiótico de amplo espectro de ação para o uso intramamário. Balde Cheio. Produção em Alta.



Aplicar 1 bisnaga por teto contaminado,
1 vez ao dia durante 3 dias.

*Carência 3 dias



FENILVET

Anti-inflamatório, analgésico e antipirético injetável não hormonal à base de Fenilbutazona.



Aplicar 1ml/50 kg,
via endovenosa, 1 vez ao dia
durante 3 dias.

ENRO FLEC

Antibiótico injetável
à base de Enrofloxacino.



Aplicar 1ml/40 kg, 1 vez ao dia,
via intramuscular durante 3 dias.

*Carência 3 dias

OU →



Aplicar 1ml/10 a 25 kg,
1 vez ao dia, via intramuscular,
durante 3 a 5 dias.

*Carência 3 dias

IODOFARM

Desinfetante e detergente à base de lodo



Assepsia dos úberes e mãos dos
ordenhadores: 100 mL / 2,5 litros de água
Pedilúvio: 100 mL / 5 litros de água



RICINUS

Pomada hidratante

Aplicar uma fina camada
nos locais com rachaduras.